

**DEROGHE TERRITORIALI AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA  
ANNO 2010**

Prot. N° 0063575

Bologna 13 aprile 2010

**Oggetto:** Reg. CE n. 1698/05; n. 1234/2007, LLRR n. 28/98 e 28/99 - Integrazione alle norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti. Autorizzazione all'impiego di nuovi prodotti fitosanitari e ulteriori modifiche

Nell'ambito dei programmi di difesa integrata previsti in applicazione del Reg. CE n. 1698/05, del Reg. CE n. 1234/2007 e delle LL.RR. n. 28/98 e 28/99, e a seguito del parere espresso dal Comitato Nazionale Difesa Integrata in data 25 marzo 2010, trasmesso con lettera del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali pervenuta in data 12 aprile 2010 (prot. 00784 del 9/4/2010), si autorizza l'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato n. 1 alla presente nota. Si precisa inoltre che, in conformità con quanto riportato nelle "Linee Guida Nazionali", viene autorizzato l'impiego dello Spinosad per la difesa del fagiolo dalla piralide, mentre viene escluso l'utilizzo del Thiaclopid per la difesa del melo dalla Cydia molesta (non autorizzato in etichetta).

**NUOVI INSERIMENTI**

| Coltura   | Avversità             | Prodotto da inserire o modificare | Limitazioni e Note  |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| Fagiolino | Botrite e Sclerotinia | Fenexamid                         | Solo in serra   |
| Pero      | Carpocapsa            | Emamectina                        | Al massimo 2 interventi all'anno. Si consiglia di iniziare l'utilizzo a partire dalla seconda generazione |
| Melo      | Carpocapsa            | Emamectina                        | Al massimo 2 interventi all'anno.   |

|   |                         |             |  |
|---|-------------------------|-------------|--|
| Anguria   | Afidi                   | Acetamiprid | In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi                                     |
| Zucca   | Afidi                   | Acetamiprid | Al massimo 1 intervento all'anno   |
| Zucchini  | Afidi-Aleurodidi        | Acetamiprid | In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi                                     |
| Indivia riccia,<br>scarola - Cicoria -<br>Radicchio | Afidi                   | Acetamiprid | In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi                                     |
| Prezzemolo  | Afidi                   | Acetamiprid | In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi                                     |
| Cavoli a<br>Infiorescenza                           | Afidi-Altica            | Acetamiprid | In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi                                     |
| Cavoli a Testa                                      | Afidi-Altica            | Acetamiprid | In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi                                     |
| Fagioli-Fagiolini                                   | Afidi                   | Acetamiprid | In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi                                     |
| Patata  | Afidi, Dorifora         | Acetamiprid | In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi                                     |
| Erba Medica   | Fitodecta-Apion<br>Pisi | Acetamiprid | Indipendentemente dal prodotto utilizzato al massimo 1 intervento insetticida all'anno sulla coltura |

|   |                                      |                       |  |
|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| Colture Portaseme:<br>Erba Medica           | Fitodecta -<br>Apion Pisi -<br>Afydi | Acetamiprid           | In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi. Al massimo 1 intervento all'anno. Indipendentemente dal prodotto utilizzato al massimo 2 interventi insetticidi all'anno sulla coltura |
| Colture Portaseme<br>Cavoli a testa         | Afydi                                | Acetamiprid           | In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi. Al massimo 1 intervento all'anno.  |
| Colture Portaseme<br>Cavoli a infiorescenza | Afydi                                | Acetamiprid           | In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi. Al massimo 1 intervento all'anno.  |
| Coltura Portaseme:<br>Cicorie               | Afydi                                | Acetamiprid           | In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi.  |
| Coltura Portaseme:<br>Pisello               | Afydi                                | Acetamiprid           | In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi. Al massimo 1 intervento all'anno.  |
| Coltura Portaseme:<br>Prezzemolo            | Afydi                                | Acetamiprid           | In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi. Al massimo 1 intervento all'anno.  |
| Coltura Portaseme:<br>Ravanello             | Afydi                                | Acetamiprid           | In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi. Al massimo 1 intervento all'anno.  |
| Sorgo                                       | Diserbo post emergenza               | Dicamba + Prosulfuron | (% s.a. 50 + 5) dose 300 - 400 gr./ha  |
| Vite, melo, pero.                           | Spollonante                          | Carfentrazone         | (% s.a. 6,45) dose 1 l./ha all'anno. Indipendentemente dall'utilizzo al massimo 1 litro/ha all'anno.   |

|   |                          |               |  |
|---|--------------------------|---------------|--|
| Vite, melo, pero, pesco, susino, kiwi, olivo.   | Diserbante               | Carfentrazone | (% s.a. 6,45). Al massimo 1 litro/ha all'anno (impiego 0,3 l./ha per ciascun intervento).<br>Indipendentemente dall'utilizzo al massimo 1 litro/ha all'anno. |
| Patata  | Disseccante pre-raccolta | Carfentrazone | (% s.a. 6,45) dose 1 l./ha all'anno. Al massimo 1 litro/ha (nei 5 - 7 gg che precedono la raccolta)  |
| Lattughino, Dolcetta, Cicorino, Rucola, Foglie germogli e steli di Brassica Spinacino | Afidi e Altica           | Acetamiprid   | In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi. Inserimento dell'altica solo per rucola Foglie e steli di brassica                         |

**ULTERIORI MODIFICHE: CAVOLI**

| Coltura                              | Avversità                  | Prodotto                     | Note - correzioni  |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Cavoli                               | Graminacee                 | FLUAZI FOP-P-BUTILE          | Eliminare. Correggere togliere da tutti i cavoli                       |
| Cavoli                               | Phoma                      | TOLCLOFOS-METILE             | Eliminare.   |
| Cavoli                               | Diserbo: Graminacee        | PROPAQUI ZAFOP               | Inserire nota "autorizzato solo su cavolo broccolo e cavolo cappuccio" |
| Cavoli                               | Diserbo: Graminacee        | Quizalofop p etile           | Inserire nota "autorizzato solo su cavolfiore e cavolo cappuccio"      |
| Cavoli                               | Diserbo: Graminacee        | Quizalofop p etile isomero D | Inserire nota "autorizzato solo su cavolfiore e cavolo cappuccio"      |
| Cavoli a infiorescenza               | Altica                     | Deltametrina                 | Aggiungere alla nota "3 interventi per i cicli sopra i 70 gg"          |
| Cavoli a infiorescenza               | Sclerotinia - Alternariosi | Pyraclostrobin+Boscalid      | Inserire. Ammesso solo su cavolo broccolo                              |
| Cavoli a Testa (Cavoli di Bruxelles) | Nottue - Cavolaia          | CIPERMETRINA                 | Inserire nota "non autorizzato su cavolo di bruxelles"                 |
| Cavoli a Testa (Cavoli di Bruxelles) | Cavolaia, nottue           | INDOXACARB                   | Inserire nota "non autorizzato su cavolo di bruxelles"                 |
| Cavoli a Testa (Cavolo verza)        | Nottue cavolaia            | Metaflumizone                | Inserire nota "non autorizzato su cavolo verza"                        |
| Cavolo nero                          | Cavolaia - Nottue          | INDOXACARB                   | Eliminare. SA Non registrata (rimane sul cinese)                       |

**ULTERIORI MODIFICHE: IV GAMMA**

| Coltura                       | Avversità                            | Prodotto                  | Note - correzioni  |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|
| Bietole da Foglia IV gamma    | Graminacee e dicotiledoni            | S-METOLACLOR              | Inserire. In pre-emergenza   |
| Cicorino IV gamma             | Tripidi                              | ABAMECTINA                | Inserimento  |
| Dolcetta                      | Marciumi basali                      | Pyraclostrobin+ boscalid  | Inserire nota "Non autorizzato su rizoctonia"                                  |
| Dolcetta                      | Marciumi basali                      | Cyprodinil+fludioxonil    | Inserire nota "autorizzato solo su sclerotinia                                 |
| Dolcetta                      | Marciumi basali                      | Fenexamid                 | Inserire nota "autorizzato solo su sclerotinia                                 |
| Dolcetta                      | tripidi                              | Spinosad                  | Al massimo 3 trattamenti all'anno  |
| Dolcetta                      | Tripidi                              | ABAMECTINA                | Inserimento  |
| Foglie e germogli di brassica | Phoma e Rizoctonia                   | CONIOTHYRIUM MINITANS     | Eliminazione. SA non registrata su avversità                                   |
| Foglie e germogli di brassica | Phoma e Rizoctonia                   | CYPRODINIL + FLUDIOXONIL  | Eliminazione. SA non registrata su avversità                                   |
| Foglie e germogli di brassica | Tripidi                              | ABAMECTINA                | Inserimento  |
| Lattughino                    | Marciumi basali                      | Tolclofos metil           | E' riportato due volte tra i p.a.  |
| Lattughino                    | Marciumi basali                      | Pencicuron                | Inserire nota "Autorizzato solo su rizoctonia"                                 |
| Lattughino                    | Marciumi basali                      | Tolclofos metil           | Inserire nota "Non autorizzato su botrite. Ammesso su sclerotinia e Rizoctonia |
| Lattughino                    | Marciumi basali                      | Pyraclostrobin+ boscalid  | Inserire nota "Non autorizzato su rizoctonia"                                  |
| Lattughino                    | Peronospora                          | Mandipropamide            | "al massimo due interventi all'anno  |
| Lattughino                    | peronospora                          | Pyraclostrobin+dimetomorf | "autorizzato solo su lollo rosso"  |
| Lattughino                    | Peronospora e Oidio                  | Azoxystrobin              | Non ammesso in coltura protetta. Eliminare                                     |
| Lattughino                    | Muffa grigia (Botrite) e Sclerotinia | PENCICURON                | Eliminazione - Sistemare nota  |

|  |   |                   |  |
|--|---|-------------------|--|
| Lattughino                               | Peronospora   | MANDI PROPAMI DE  | Inserimento  |
| Lattughino                               | Sclerotinia   | BACILLUS SUBTILIS | Inserimento  |
| Lattughino                               | Tripidi   | ABAMECTINA        | Inserimento  |
| Lattuhino                                | Peronospora   | Metalaxil-M       | Precisare che illattughino riguarda coltura protetta di lattughino e a cespo |
| Lattuhino                                | Precisare che per lattughino si intende lattuga in coltura protettae quindi la scheda riguarda sia lattughino che lattuga a cespo |                   |  |
| Rucola Pieno campo e in Coltura Protetta | Acari   | Abamectina        | Non registrato sull'avversità  |
| Rucola in Coltura Protetta               | Aleurodidi  | BUPROFEZIN        | SA Revocata (eliminare anche in altre colture dove rimasto)                  |
| Rucola                                   | Minatrice fogliare  | Ciromazina        | Togliere perchè avrebbe solo il pieno campo che viene revocato               |
| Rucola in Coltura Protetta               | Peronospora   | MANDI PROPAMI DE  | Inserimento. "al massimo 2 trattamenti all'anno                              |
| Rucola in Coltura Protetta               | Rizoctonia e Sclerotinia  | PROPAMOCARB       | Eliminazione. SA non registrata su avversità                                 |
| Rucola in Coltura Protetta               | Pythium   | PROPAMOCARB       | Inserimento nota. Solo in miscela con fosetil AL                             |
| Rucola in Coltura Protetta               | Diserbo   | benfluralin       | Pre semina   |

|                            |                           |              |   |
|----------------------------|---------------------------|--------------|---|
| Rucola in Coltura Protetta | Graminacee e dicotiledoni | BENFLURALIN  | Inserimento in pre emergenza  |
| Rucola in Coltura Protetta | Aleurodidi                |              | Gli aleurodid sono riportati due volte nella scheda, elnare il secondo grupo in cui sono riportatti:<br>Imidacloprid + Ciflutrin, Azadiractina Piretrine e Buprofezin |
| Rucola in Coltura Protetta | Tripidi                   | ABAMECTINA   | Inserimento   |
| Spinacino                  | Graminacee e dicotiledoni | S-METOLACLOR | Eliminazione postemergenza - Inserire pre emergenza   |

**ULTERIORI MODIFICHE: ORTICOLE**

| Coltura                      | Avversità                 | Prodotto   | Note - correzioni   |
|------------------------------|---------------------------|--|---|
| Bietola da costa e da foglia | Diserbo                   | S-metolaclo: amesso in pre emergenza non in post. Dose 0,5 l/ha. | Amnesso in pre emergenza non in post. Dose 0,5 l/ha.  |
| Cetriolo                     | Nematodi                  | Oxamyl   | Modificare nota: da etichetta ammessi 2 interventi per ciclo, max 20 litri complessivi, non 30 come indicato nella nota |
| Cocomero                     | Diserbo                   | Fluazifop p butil  | Revocato, eliminare   |
| Colture varie                | Patogeni tellurici        |  | Eliminare nota "ammesso solo in terreni sabbiosi"   |
| Melone                       | Diserbo/Fluazifop p butil | Fluazifop p butil  | Revocato, eliminare   |
| Sedano                       | Afidi, Nottue             | Lambdacialotrina: non ammesso in serra                           |   |
| Zucca                        | Afidi                     | IMI DACLOPRID  | Inserire  |
| Zucchino                     | Nematodi                  | Oxamyl   | Modificare nota: da etichetta ammessi 2 interventi per ciclo, max 20 litri complessivi, non 30 come indicato nella nota |
| Ravanella                    | Lambdacialotrina          | Non autorizzato su mosca da cavolo, ma solo mosca bianca         |   |

**ULTERIORI MODIFICHE: FRUTTICOLE**

| Coltura | Avversità      | Prodotto        | Note - correzioni   |
|---------|----------------|-----------------|---|
| Fragola | Phytophthora   | Metalaxyl-M     | Inserire  |
| Pero    | Fitoregolatori | 6-benziladenina | Ccme diradante non è registrata. Togliere                           |
| Susino  | Tentredini     | Thiametoxam     | Nella nota relativa ai neonicotinoidi, aggiungere anche Thiametoxam |
| Pesco   | cicaline       | Thiametoxam     | Nota: aggiungere "indipendentemente dall'avversità"                 |

**ULTERIORI MODIFICHE: ORTICOLE A FOGLIA**

| Coltura         | Avversità                 | Prodotto        | Note  |
|-----------------|---------------------------|-----------------|---|
| Cicoria         | Nottue                    | Indoxacarb      | Inserire  |
| Cicoria         | Tripidi                   | ABAMECTINA      | Inserimento   |
| Indivia Riccia  | Tripidi                   | ABAMECTINA      | Inserimento Per i tripidi                             |
| Indivia Scarola | Tripidi                   | ABAMECTINA      | Inserire  |
| Indivia/scarola | Bremia                    | Metalaxil-M:    | Togliere limitazione all'utilizzo in coltura protetta |
| Lattuga         | Muffa grigia, sclerotinia | PYRIMETHANIL    | Inserire nota "autorizzato solo su botrite"           |
| Lattuga         | Muffa grigia, sclerotinia | Tolclofos       | Inserire nota "autorizzato solo su sclerotinia"       |
| Lattuga         | Peronospora               | METALAXIL-M     | Eliminazione divieto in serra. Ammesso in serra       |
| Radicchio       | Tripidi                   | ABAMECTINA      | Inserimento per tripidi                               |
| Radicchio       | Tutte                     | LAMBDAHALOTRINA | Inserimento Divieto in serra                          |
| Spinacio        | Cleono                    | DELTAMETRINA    | SA non registrata su avversità                        |
| Spinacio        | Minatrice fogliare        | SPI NOSAD       | Eliminare SA non registrata su avversità              |